



Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Рентгенологические исследования

Компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При наличии данных предыдущих исследований (стационарного лечения) – УЗИ, МРТ, КТ – необходимо предоставить врачу.

Исследование проводится до рентгенологических исследований пищеварительного тракта с бариевой взвесью, либо через неделю после.

ПОДГОТОВКА

За 2 часа до исследования необходимо отказаться от употребления пищи.

Требуется снять все металлические предметы в области сканирования (пирсинг).

После исследования необходимо употреблять больше жидкости, чтобы увеличить объем выделяемой мочи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

Исследование проводится натощак или через 2-3 часа после последнего приема пищи. Исследование проводится до рентгенологических исследований пищеварительного тракта с бариевой взвесью либо через 1-1,5 недели после.

Пациентам, принимающим метформин-содержащие препараты (глюкофаж, сиофор и т.д.), следует прекратить прием этих препаратов с момента введения контрастного средства и возобновить прием через 48 ч после исследования.