



Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Магнитно-резонансная томография органов малого таза

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При наличии данных предыдущих исследований (стационарного лечения) – УЗИ, МРТ, КТ – необходимо предоставить врачу.

Требуется обязательно предупредить врача при наличии в теле имплантированных медицинских изделий. Стенты и металлоконструкции не являются противопоказанием к проведению МРТ.

При наличии кардиостимулятора и других электронных устройств необходимо предоставить сопроводительные документы, позволяющие идентифицировать изделие как МР-совместимое, МР-несовместимое или МР-совместимое при определенных условиях.

В спорных вопросах требуется консультация рентгенолога, специализирующегося на МРТ.

ПОДГОТОВКА

За 6 часов до исследования прекратить прием пищи (лицам с сахарным диабетом необходимо согласовать возможность такой подготовки).

За 1 час до исследования необходимо принять спазмолитическое средство.

В день исследования пациент употребляет жидкость в обычном режиме.

За 1 час до исследования выпить 700-1000 мл жидкости.

Требуется снять все металлические предметы в области сканирования (пирсинг).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

Исследование проводится натощак или через 2-3 часа после последнего приема пищи. Исследование проводится до рентгенологических исследований пищеварительного тракта с бариевой взвесью либо через 1-1,5 недели после.

Пациентам, принимающим метформин-содержащие препараты (глюкофаж, сиофор и т.д.), следует прекратить прием этих препаратов с момента введения контрастного средства и возобновить прием через 48 ч после исследования.