



Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Рентгенологические исследования

Обзорная и экскреторная урография

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При наличии данных предыдущих исследований (стационарного лечения) – необходимо предоставить врачу:

- биохимический анализ крови на уровень сывороточного креатинина у следующих групп пациентов:

- а) в возрасте старше 60 лет;
- б) наличие в анамнезе заболеваний почек (трансплантация, единственная почка, онкология почки, операция на почках, воспалительные заболевания);
- в) наличие в анамнезе артериальной гипертензии, требующей медикаментозного лечения;
- г) наличие в анамнезе сахарного диабета любого типа;
- д) наличие в анамнезе подагры;
- е) протеинурия/альбуминурия с уровнем А1 и выше;
- ж) недавний прием нефротоксических лекарственных средств (нестероидные противовоспалительные средства при хроническом применении в высоких дозах (более 1 грамма в день в течение более двух лет), диуретики при регулярном длительном приеме, циклоспорин, цисплатин, аминогликозиды, амфотерицин и др.).

ЗА 3 ДНЯ ДО ИССЛЕДОВАНИЯ

За 3 дня до исследования рекомендовано соблюдение диеты с исключением продуктов, усиливающих перистальтику кишечника и газообразование (мучные изделия, черный хлеб, сырые овощи и фрукты, бобовые, молоко, соки, газированные напитки и другие).

Необходимо выполнить очищение толстой кишки накануне и в день исследования (очистительная клизма или прием слабительного средства (Эндофальк/ Фортране/ Мовипреп/Левакол/ Флит) по инструкции).

Строго по рекомендации врача - для пациентов, принимающих метформинсодержащие препараты - следует прекратить прием этих препаратов с момента введения контрастного средства, и возобновить прием через 48 ч после исследования.