



Правила подготовки к лабораторным исследованиям

Анализ мочи на стерильность (посев мочи)

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед сбором анализа мочи проводится тщательный туалет наружных половых органов.

Утренняя моча собирается в стерильный лабораторный контейнер с крышкой. Контейнер снабжают направлением, собранную мочу сразу направляют в лабораторию.

Первые 15 мл мочи для анализа не используются, берутся последующие 5- 10 мл.

Сбор мочи проводится до начала медикаментозного лечения.

Если необходимо оценить эффект проведенной терапии, то посев мочи производится по окончании курса лечения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации.

Запрещено использовать для исследования мочу из судна, горшка!

Прием лекарственных препаратов необходимо согласовать с лечащим врачом.

По возможности необходимо исключить прием мочегонных препаратов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛА ДОМА И ДОСТАВКИ В ЛАБОРАТОРИЮ

Собранная моча доставляется в лабораторию в течение 1,5-2 часов после сбора.

Хранить мочу необходимо в медицинском контейнере допускается при $t = (+2) - (+8) ^\circ\text{C}$ - непродолжительное время.

Хранение в холодильнике допускается при $t +2^\circ\text{C}; +8^\circ\text{C}$ - не более 3-4 часов.